

## SafeR Handdisinfection liquid

97-92545

IMPROVED  
FORMULA

### Handdisinfection

- Ready to use hand disinfectant alcohol based for surgical and hygienic hand disinfection.
- Desinfectante alcohólico para las manos, listo para usar, para la desinfección quirúrgica e higiénica de las manos.
- Désinfectant à base d'alcool et prêt à l'emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.
- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zur chirurgischen und hygienischen Händedesinfektion.
- Disinfettante a base di alcol, pronto per l'uso, per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani
- Gebruiksklare handdesinfectans op alcohol basis voor chirurgische en hygiënische handdesinfectie.



LOT

Irritant, Irritante, Irritant,  
Reizend, Irritante, Irriterend

150ml

en onderarmen ingesmeerd te worden met het desinfectans en dient dit gedurende 5 minuten in te trekken. Voor het desinfecteren van de huid voor simpele injecties en punctie van periferie vaten dient de huid grondig ingeweven te worden met het desinfectans en dient dit 1 minuut in te trekken. Voor huid met vlekken, de huid grondig inwrijven en dit gedurende 10 minuten laten zitten. Om dit te gebruiken als een koelmiddel de oplossing voor gebruik mengen met een gelijke hoeveelheid water. **Microbiologische doeltreffendheid:** Bacteriën conform VAH/DGHM, EN 1500, EN 12791, prEN 12054; levurociden (*Candida albicans*) conform VAH/DGHM, EN 1275, tuberculocide (EN 14348), "beperkte virussen" (effectief tegen membraan omhulde virussen, d.w.z. HBV, HIV, HCV). **Werkzaamheid:** Bacteriën en *Candida albicans*: Hygiënische handdesinfectie conform VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275; geconcentreerd: 30 sec. chirurgische handdesinfectie conform VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: geconcentreerd: 1 min. TBB (Tuberculose) conform EN 14348 (hoge biologische belasting): geconcentreerd: 30 sec. Met membraan bedekte virussen (d.w.z. HBV, HIV, HCV) conform BGA(RKI)/DW: geconcentreerd: 15 sec.

**Indications for use:** For hygienic purpose rub the hand thoroughly with the disinfectant and leave for 30 seconds. For surgical purpose, the hands and lower arms should be rubbed with the disinfectant and leave for 5 minutes. For disinfecting simple injections and puncture peripheral vessels, the skin should be thoroughly rubbed with the disinfectant and leave for 1 minute. For skin with sebaceous glands, rub the skin thoroughly and leave for 10 minutes. To act as a coolant mix the solution with equal amount of water before use. **Microbiological Effectiveness:** Bactericid according to VAH/DGHM, EN 1500, EN 12791, prEN 12054; levurocid (*Candida albicans*) according to VAH/DGHM, EN 1275, tuberculocide (EN 14348), "restricted viruses" (effective against membrane covered viruses, i.e. HBV, HIV, HCV). **Effectivity:** Bacteria and *Candida albicans*: Hygienic Hand disinfection in accordance to VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: concentrated: 30 sec. surgical Hand disinfection in accordance to VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrated: 1 min. TBB (tuberculosis) in accordance to EN 14348 (high bio load): concentrated: 30 sec. Membrane covered viruses [i.e. HBV, HIV, HCV] in accordance to BGA(RKI)/DW: concentrated: 15 sec. 100g contains: 62,8 g 2-Propanol **Safety instruction:** Flammable. Irritating to eyes. Vapours may cause drowsiness and dizziness. Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition – No smoking. Avoid contact with eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

DEHP™ DE Healthcare Products  
DEDICATED TO EXCELLENCE

Distributed by/Distribuido por/Distribuée par/Vertrieb durch/Distribuito da:  
DE Healthcare Products, Gillingham ME8 0SB U.K., [www.delphbrand.com](http://www.delphbrand.com)

**Instrucciones de uso:** Para una desinfección higiénica, frotar las manos a conciencia con el desinfectante y dejar actuar 30 segundos. Para una desinfección quirúrgica, frotar las manos y los antebrazos con el desinfectante y dejar actuar 5 minutos. Para la desinfección en el caso de inyecciones y punciones sencillas en los vasos periféricos, frotar la piel a conciencia con el desinfectante y dejar actuar durante 1 minuto. Para la piel con glándulas sebáceas, frotar la piel a conciencia y dejar actuar durante 10 minutos. Para que actúe como refrigerante, mezclar la solución con una cantidad igual de agua antes de su uso. Eficacia

**microbiologique:** Bactericida conforme à la VAH/DGHM, EN 1500, EN 12791, prEN 12054; levuricida (*Candida albicans*) conforme à la VAH/DGHM, EN 1275; tuberculicida [EN 14348], «virus restrengidos» [efficace contre virus enveloppés en membrane, à saber, VHB, VIH, VHC]. **Efficacité:** Bactéries et *Candida albicans*: Desinfection higiénica de las manos conforme a las VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: concentrado: 30 seg. Desinfection chirúrgica de las manos conforme a las VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrado: 1 min. 1BB (tuberculosis) conforme a la EN 14348 [alta carga biológica]: concentrado: 30 seg. Virus enveloppés en membrane (à saber, VHB, VIH, VHC) conforme a la BGA (RKI)/DV: concentrado: 15 seg., **Precautions de sécurité:** inflamable. Irrite les yeux. La inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux.

**Mode d'emploi:** Pour un lavage hygiénique, appliquer le désinfectant sur les mains et froter vigoureusement, laisser agir pendant 30 secondes. Pour un lavage chirurgical, appliquer le désinfectant sur les mains et les avant-bras et froter, laisser agir pendant 5 minutes. Pour une désinfection en cas d'injection simple et de ponction des vaisseaux périphériques, appliquer le produit sur la peau et froter vigoureusement, puis laisser agir pendant 1 minute. Pour les peaux grasses, appliquer le produit et froter vigoureusement, puis laisser agir pendant 10 minutes. Pour une action rafraîchissante, mélanger un volume de solution à un volume d'eau avant utilisation. **Microbiologie:** Bactéricide conformément aux recommandations VAH/DGHM, aux normes EN 1500, EN 12791, prEN 12054; levuricida (*Candida albicans*) conformément aux recommandations VAH/DGHM, norme EN 1275; tuberculicida (EN 14348), «virucide limité» [efficace contre les virus enveloppés, céd.: VHB, VIH, VHC]. **Efficacité:** Bactéries et *Candida albicans*: Désinfection hygiénique des mains conformément aux recommandations VAH/DGHM, et aux normes EN 1500, prEN 12054, EN 1275: 30 sec. Désinfection chirurgicale des mains conformément aux recommandations VAH/DGHM et aux normes EN 12791, prEN 12054: 1 min. TbB (Tuberculose) conformément à la norme EN 14348 (charge bio élevé): 30 sec. Virus enveloppés (VHB, VIH, VHC) conformément aux normes BGA (RKI)/DV: 15 sec. **100 g contiennent:** 62,8 g 2-Propanol. **Consigne de sécurité:** Inflammable. Irritant pour les yeux. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux.

hygiénique des mains conformément aux recommandations VAH/DGHM, et aux normes EN 1500, prEN 12054, EN 1275: 30 sec. Désinfection chirurgicale des mains conformément aux recommandations VAH/DGHM et aux normes EN 12791, prEN 12054: 1 min. TbB (Tuberculose) conformément à la norme EN 14348 (charge bio élevé): 30 sec. Virus enveloppés (VHB, VIH, VHC) conformément aux normes BGA (RKI)/DV: 15 sec. **100 g contiennent:** 62,8 g 2-Propanol. **Consigne de sécurité:** Inflammable. Irritant pour les yeux. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver le récipient bien fermé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – Ne pas fumer. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Eliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux.

**Hinweise zur Anwendung:** Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punctionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und von Funktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten. Für Kuhmenschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden. **Wirkungsspektrum:** Bakterizid nach VAH/DGHM, EN 1500, EN 12791, prEN 12054; levuricida (*Candida albicans*) nach VAH/DGHM, EN 1275; tuberkulozid nach EN 14348, „begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber bestimmten Viren, z.B. HBV, HIV, HCV). **Einwirkzeiten:** Bakterien und *Candida albicans*: Hygienisch Händedesinfektion nach VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: Konz. 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: Konz. 1 min. TbB (Tuberkulose) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 30 sec. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach BGA(RKI)/

DV: Konz. 15 sec. **In 100g sind enthalten:** 62,8 g 2-Propanol, gereinigtes Wasser. Sicherheitshinweise: Entzündlich. Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Behälter nicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. **VAH/DGHM gelistet** BAJA/N: N-38682

**Istruzioni per l'uso:** Applicare il disinsettante e frizionare bene le mani. Attendere 30 secondi. Nella applicazioni chirurgiche, applicare il disinsettante su mani e avambracci e frizionare a fondo. Attendere 5 minuti. Per la disinfezione nelle iniezioni o puntura dei vasi periferici, applicare sulla pelle frizionando a fondo e attendere 1 minuto. Per la pelle con ghiandole sebacee, applicare sulla pelle frizionando a fondo e attendere 10 minuti. Per usare il prodotto come refrigerante, miscelare la soluzione con una quantità equivalente d'acqua prima dell'uso. **Efficacia microbiologica:** Baktericida secondo VAH/DGHM, EN 1500, EN 12791, prEN 12054; levuricida (*Candida albicans*) secondo VAH/DGHM, EN 1275; tuberkolocida [EN 14348]; «virus limitati» [efficace contro virus capsulati, per es. HBV, HIV, HCV]. **Efficacia:** Bactéries et *Candida albicans*: Disinfezione igienica delle mani secondo VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: concentrato: 30 sec. Disinfezione chirurgica delle mani secondo VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrato: 1 min. TbB (Tuberculosis) secondo EN 14348 [alta carica biologica]: concentrato: 30 sec. Virus capsulati (HBV, HIV, HCV) secondo BGA (RKI)/DV: concentrato: 15 sec. **100 g contengono:** 62,8 g 2-propanolo. **Istruzioni di sicurezza:** inflamabile. Irritante per gli occhi. L'inhalazione dei vapori può provocare somnolenza e vertigini. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

**Indications voor gebruik:** Wrijf de handen om hygiënische redenen grondig in met het desinfectants en laat gedurende 30 seconden inwerken. Voor chirurgische doeleinden dienen de handen