

Safe R Handdisinfection liquid

IMPROVED
FORMULA

97-92546

Handdisinfection

- Ready to use hand disinfectant alcohol based for surgical and hygienic hand disinfection.
- Desinfectante alcohólico para las manos, listo para usar, para la desinfección quirúrgica e higiénica de las manos.
- Désinfectant à base d'alcool et prêt à l'emploi pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains.
- Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel zur chirurgischen und hygienischen Händedesinfektion.
- Disinfettante a base di alcol, pronto per l'uso, per la disinfezione igienica e chirurgica delle mani.
- Gebruiksklare handdesinfectans op alcohol basis voor chirurgische en hygiënische handdesinfectie.

Indications for use: For hygienic purpose rub the hand thoroughly with the disinfectant and leave for 30 seconds. For surgical purpose, the hands and lower arms should be rubbed with the disinfectant and leave for 5 minutes. For disinfecting simple injections and puncture peripheral vessels, the skin should be thoroughly rubbed with the disinfectant and leave for 1 minute. **Microbiological effectiveness/Effectivity:** Bacteria and Candida albicans: Hygienic Hand disinfection in accordance to VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: concentrated: 30 sec. surgical Hand disinfection in accordance to VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrated: 1 min. TbB (Tuberculosis) in accordance to EN 14348 (high bio load): concentrated: 30 sec. Membrane covered viruses (i.e. HBV, HIV, HCV) in accordance to BGA(RKI)/DVV: concentrated: 15 sec. **100g contains:** 62,8 g 2-Propanol, Purified water **Safety Precautions:** R 10 Flammable. R 36 Irritating to eyes. R 67 Vapours may cause drowsiness and dizziness. S 7 Keep container tightly closed. S 16 Keep away from sources of ignition - No smoking. S 25 Avoid contact with eyes. S 26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. S 60 This material and its container must be disposed of as hazardous waste. Packing material should be completely emptied of contents before disposal.

Instrucciones de uso: Para una desinfección higiénica, frotar las manos a conciencia con el desinfectante y dejar actuar 30 segundos. Para una desinfección quirúrgica, frotar las manos y los antebrazos con el desinfectante y dejar actuar 5 minutos. Para la desinfección en el caso de inyecciones y punciones sencillas en los vasos periféricos, frotar la piel a conciencia con el desinfectante y dejar actuar durante 1 minuto. **Eficacia microbiológica/Eficacia:** Bacterias y Candida albicans: Desinfección higiénica de las manos conforme a las VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: concentrada: 30 seg. Desinfección quirúrgica de las manos conforme a las VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrada: 1 min. TBB (Tuberculosis) conforme a la EN 14348 (alta carga biológica): concentrada: 30 seg. Virus envueltos en membrana (a saber, VHB, VIH, VHC) conforme a las BGA (RKI)/DVV: concentrada: 15 seg. **100 g contienen:** 62,8 g de 2-Propanol **Precauciones de seguridad:** R 10 Inflamable. R 36 Irrita los ojos. R 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. S 7 Manténgase el recipiente bien cerrado. S 16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. S 25 Evite el contacto con los ojos. S 26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acídase a un médico. S 60 Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos. El contenido del envase debe vaciarse totalmente antes de desecharlo.

Mode d'emploi: Pour un lavage hygiénique, appliquer le désinfectant sur les mains et frotter vigoureusement, laisser agir pendant 30 secondes. Pour un lavage chirurgical, appliquer le désinfectant sur les mains et les avant-bras et frotter, laisser agir pendant 5 minutes. Pour une désinfection en cas d'injection simple et de ponction des vaisseaux périphériques, appliquer le produit sur la peau et frotter vigoureusement, puis laisser agir pendant 1 minute. **Microbiologie/Efficacité:** Bactéries et Candida albicans: Désinfection hygiénique des mains conformément aux recommandations VAH/DGHM, et aux normes EN 1500, prEN 12054, EN 1275: 30 sec. Désinfection chirurgicale des mains conformément aux recommandations VAH/DGHM, et aux normes EN 12791, prEN 12054: 1 min. TBB (Tuberculose) conformément à la norme EN 14348 (charge bio élevée): 30 sec. Virus enveloppés (VHB, VIH, VHC) conformément aux normes BGA (RKI)/DVV: 15 sec. **100 g contiennent:** 62,8 g 2-Propanol, Eau purifiée **Consigne de sécurité:** R 10 inflammable. R 36 Irritant pour les yeux. R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. S 7 Conserver le récipient bien fermé. S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. S 25 Éviter le contact avec les yeux. S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S 60 Éliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux. L'emballage doit être entièrement vidé de son contenu avant de l'éliminer.

Hinweise zur Anwendung: Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten. Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten. Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten. **Wirkungsspektrum/Einwirkzeiten:** Bakterien und Candida albicans: Hygienisch Händedesinfektion nach VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: Konz. 30 sec. Chirurgische Händedesinfektion nach VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: Konz. 1 min. TbB (Tuberculose) nach EN 14348 (hohe Belastung): Konz. 30 sec. Behüllte Viren (z.B. HBV, HIV, HCV) nach BGA(RKI)/DVV: Konz. 15 sec. **In 100g sind enthalten:** 62,8 g 2-Propanol, gereinigtes Wasser **Sicherheitshinweise:** R 10 Entzündlich. R 36 Reizt die Augen. R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

S 7 Behälter dicht geschlossen halten. S 16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. S 25 Berührung mit den Augen vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen. VAH/DGHM gelistet. BAUA-Nr. 38648

Istruzioni per l'uso: Applicare il gel e frizionare bene le mani. Attendere 30 secondi. Nella applicazioni chirurgiche, applicare il gel su mani e avambracci e frizionare a fondo. Attendere 5 minuti. Per la disinfezione nelle iniezioni o punture dei vasi periferici, applicare sulla pelle frizionando a fondo e attendere 1 minuto. **Efficacia microbiologica/Eficacia:** Batteri e Candida albicans: Disinfezione igienica delle mani secondo VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: concentrato: 30 sec. Disinfezione chirurgica delle mani secondo VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: concentrato: 1 min. TbB (Tuberculosis) secondo EN 14348 (alta carica biologica): concentrato: 30 sec. Virus capsulati (HBV, HIV, HCV) secondo BGA (RKI)/DVV: concentrato: 15 sec. **100 g contengono:** 62,8 g 2-propanolo, Acqua depurata **Istruzioni di sicurezza:** R 10 infiammabile. R 36 irritante per gli occhi. R 67 L'inhalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. S 7 Conservare il recipiente ben chiuso. S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. S 25 Evitare il contatto con gli occhi. S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. La confezione va svuotata completamente prima dello smaltimento.

Indicaties voor gebruik: Wrijf de handen om hygiënische redenen grondig in met het desinfectans en laat gedurende 30 seconden inwerken. Voor chirurgische doeleinden dienen de handen en onderarmen ingesmeerd te worden met het desinfectans en dient dit gedurende 5 minuten in te trekken. Voor het desinfecteren van de huid voor simpele injecties en punctie van perifere vaten dient de huid grondig ingevreven te worden met het desinfectans en dient dit 1 minuut in te trekken. **Microbiologische doeltreffendheid/Werksaamheid:** Bacteriën en Candida albicans: Hygiënische handdesinfectie conform VAH/DGHM, EN 1500, prEN 12054, EN 1275: geconcentreerd: 30 sec. chirurgische handdesinfectie conform VAH/DGHM, EN 12791, prEN 12054: geconcentreerd: 1 min. TbB (tuberculose) conform EN 14348 (hoge biologische belasting): geconcentreerd: 30 sec. Met membraan bedekte virussen (d.w.z. HBV, HIV, HCV) conform BGA(RKI)/DVV: geconcentreerd: 15 sec. **100 g bevat:** 62,8 g 2-propanol, Gereinigd water **Veiligheidsinstructies:** R 10 ontvlambaar. R 36 Irriteerd voor de ogen. R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S 7 In goed gesloten verpakking bewaren. S 16 Verwijder houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. S 25 Aanraking met de ogen vermijden. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S 60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Verpakkingsmateriaal dient volledig geleegd te zijn voorafgaand aan verwijdering.



Irritant, Irritant, Irritant,
Reizend, Irritant, Irriterend



LOT

Contents:
Contenido/Contenu:
Inhalt/Contenuto:
Inhoud: **250ml e**

DEHP DE Healthcare Products
DEDICATED TO EXCELLENCE
Distributed by/Vertriebt per/Distribuíd por/Vertréid durch/Distributó de:
DE Healthcare Products, Gilingham NE8 0SB U.K., www.dehpbroad.com